

さわやか健康センターだより

申し込み・問い合わせ
 さわやか健康センター
 子ども家庭支援センター共通
 TEL 5-1856 FAX 5-1857
 メールアドレス
 さわやか健康センター kenkou@nijjima.com
 子ども家庭支援センター kodomo@nijjima.com

四種混合ワクチンについて

11月1日より、四種混合ワクチンが定期予防接種に導入されます。

▼四種混合ワクチン（一般名：沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活性化ポリオワクチン）

▼標準的な接種年齢と接種方法

○1期初回接種
 生後3ヶ月～12ヶ月の期間に、20日～56日の間隔をおいて3回接種する。

○1期追加接種

1期初回接種（3回）終了後（6ヶ月以上の間隔が望ましい）、12ヶ月～18ヶ月に達するまでに1回接種する。

対象年齢

生後3ヶ月～90ヶ月のお子さん。

▼接種日

11月からの定期予防接種日に接種可能です。接種するには予約が必要です。

（広報にいじまお知らせ版No.53もしくは下記「定期予防接種☆要予約」を参照）

▼過去のワクチン接種歴に応じた対応

原則として最初に使用した不活化ポリオワクチン（単独または四種混合）を接種回数が終わるまで使用することになります。

平成24年8月以降に生まれたお子さんなど、11月からの四種混合ワクチンを含めた予防接種スケジュールにつきましては、保健師が個別相談に応じます。お問い合わせください。

予約・問い合わせ

さわやか健康センター

育児学級「かたんヨガ」

子育てをしている保護者の皆さん、子育て中で忙しいときだからこそ、心身をゆつくりとヨガでほぐしてみませんか？事前申込は不要ですので、ぜひご参加ください。（当日は動きやすい服装でお越し下さい。）

▼新島地区

とき 10月11日（木）

午前9時20分～10時30分

場所 さわやか健康センター

▼式根島地区

とき 10月24日（水）

午前9時20分～10時30分

場所 開発総合センター

対象者 0～3歳までのお子さんとその保護者

持ち物 母子健康手帳（出席カード）、オムツ、飲み物、バスタオル等は各自で用意ください。

問い合わせ さわやか健康センター

定期予防接種☆要予約

▼新島地区

とき 10月3日（水）

午後3時半～4時半

とき 11月7日（水）

午後3時半～4時半

場所 本村診療所

▼式根島地区

とき 10月4日（木）

午後3時～3時半

とき 11月1日（木）

午後3時～3時半

場所 式根島診療所

▼全地区の共通ルール

予約締切 接種日の1週間前まで

問い合わせ・予約 さわやか健康センター

▼お願い

○接種日の受付時間は厳守してください。

○予防接種の後には、体調に変化がおきることがあります。

診療所の中で30分ほど休んでください。

完全予約制★新島・式根島地区インフルエンザ予防接種の申し込みについて

実施日	10月25日(木)	10月26日(金)	11月2日(金)	11月9日(金)	11月15日(木)	11月16日(金)	11月30日(金)
接種場所	若郷診療所	健康センター式根島診療所	健康センター式根島診療所	健康センター式根島診療所	若郷診療所	健康センター式根島診療所	健康センター式根島診療所
時間	本村さわやか健康センター：午後2:00～5:30 式根島診療所：午後2:00～4:00 若郷診療所：午後3:30～5:30						
※ 10/26は2回接種を行う13歳未満のお子さんとその保護者および高齢者優先。13歳以上は11/2～になります。							
予約日時	10月1日（月）～5日（金）まで 午前8:30～午後5:15						
予約場所	さわやか健康センターで接種希望の方はさわやか健康センターへ（☎5）1856） 式根島診療所で接種希望の方は式根島支所へ（☎7）0004） 若郷診療所で接種希望の方は若郷支所へ（☎5）0181） ※ 3地区どこの接種場所でも受けられます。						
料金	6ヶ月～13歳未満		各1000円 2回接種				
	13歳～65歳未満		1500円				
	65歳以上		1000円				
その他	60歳以上65歳未満で心臓、肝臓、もしくは呼吸器の機能に障害のある方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で手帳1級をお持ちの方 1000円 生活保護者、免除						
	予約のときに日時を決めます。希望が有る場合はお申し出ください。なお、多人数が同じ日時に重なった場合、希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 予約締切日以降の予約は受けできませんので、ご了承ください。						

【予約接種日からのインフルエンザ接種】

○麻しん風疹・おたふく・BCG・水疱瘡（生ワクチン）の接種日から1ヶ月後にインフルエンザ可能。

○不活化ポリオ、ヒブ、肺炎球菌、日本脳炎三種混合（不活化ワクチン）の接種日から1週間後にインフルエンザ可能。